

REAKCE PO OČKOVÁNÍ – uschovat pro potřeby rodičů

Reakce může (ale většinou není) nastat již za 4 hodiny po očkování a může trvat 48 hodin. V případě reakce po očkování je vhodný poloklidový režim, jinak je dítě „zdravé – naočkované“ – můžete s ním na vycházku, večer vykoupat/osprchovat apod. Jinak se chovejte jako za režimu COVID 19/karantény – není vhodná MHD, hypermarkety, nechodte mezi ostatní děti zejména do uzavřených prostor apod. Vhodné je dát dítěti večer – kolem 18. hodiny Paralen čipek.

Normální reakce po očkování

- zatvrdnutí v místě vpichu, vstřebává se i několik měsíců (jakoby „hrášek“ v podkoží), u někoho to může přetrvávat dlouhodobě a postupně, jak dítě roste a zvětšuje se svalová hmota, tak to nebude hmatné
- zarudnutí v místě vpichu do 10 cm
- teplota – reagující na antipyretika, maximálně 48-72 hodin
- neklid, plačtivost, spavost

Nežádoucí reakce

- nutno hlásit – na středisko, my pak hlásíme SÚKLu
- teplota nad 38° C nereagující na antipyretika déle než 72 hodin
- nepřerušovaný neutišitelný pláč trvající více než 6 hodin (vysoce laděný křik), normální pláč po očkování je běžná reakce

Léčba

- jen zatvrdnutí v místě vpichu lze ponechat bez léčby
- zarudnutí – studený obklad (mokrá kapesník lze dát přímo na kůži), gelové polštářky z mrazáku jen přes suchou látku (pozor na omrzliny!)
- do 3 měsíců jen paracetamol = Paralen, Panadol v dávce 15 mg/kg dítěte, lze opakovat á 6 hodin (celkem tedy 4x/24 hodin)
- od 3 měsíců lze i ibuprofen = Nurofen, Ibalgin, Brufen – dávkování 30 mg/kg dítěte a 24 hodin – celkovou dávku pak rozdělit do 3-4 dávek
- neklid – analgetika – dle věku Paralen či Nurofen